

KINESITHERAPEUTISCHE BEHANDELING NA EEN MENISCUSHECHTING

Revalidatie bij een hechting van de mediale meniscus

Immobilisatie:

- * *0-4 weken postoperatief*: kniebrace gefixeerd in volledige extensie dag en nacht
- * kniebrace verstellen *tijdens het oefenen* tot toegelaten ROM
- * *na 4 weken postoperatief*: kniebrace progressief verwijderen

Gangrevalidatie:

- * *0-4 weken postoperatief*: stappen met 2 krukken zonder steunname en brace gefixeerd
- * *na 4 weken postoperatief*: stappen met 2 krukken en progressief volledig belasten

De krukken mogen weggelaten worden bij een goede spiercontrole en extensietekort van < dan 5°.

Mobiliteit:

- * patellamobilisaties (minimum 8 weken)
- * *0-4 weken postoperatief*: actieve en passieve mobilisaties van 0° tot de bereikte mobiliteit zonder spanning op de meniscus (meestal rond 60° flexie)
- * *na 4-6 weken postoperatief*: streven naar volledige mobiliteit

Spiertraining:

- * *0-4 weken postoperatief*:
 - kuitspieroefeningen
 - cocontracties hamstrings/quadriceps
 - isometrisch
 - dynamisch
 - in verschillende graden van knieflexie

DR. HANS VAN DEN WYNGAERT

Orthopedisch chirurg - gespecialiseerd in de behandeling van knieletsels

AZ Alma
Ringlaan 15
9900 Eeklo (BE)

RIZIV 1-08298-51-480
TEL +32 (0)9 310 04 36
MAIL secr.ortho@azalma.be

In de initiële fase van de revalidatie zijn gesloten keten oefeningen af te raden wegens het steunverbod.

In de onmiddellijke postoperatieve fase is er nog geen sprake van krachttraining. De oefeningen dienen aan lichte intensiteit aangevat te worden (50% van maximale kracht) en progressief opgedreven tot 60-70%.

De gesloten keten oefeningen (na 4-6 weken) moeten opgebouwd worden vanuit minder belaste posities (fiets, leg-press, steps...) naar meer belaste uitgangshoudingen (vb. squat). De progressie in de oefentherapie is afhankelijk van pijn, zwelling en quadricepscontrole.

Proprioceptie en coördinatie oefeningen:

- * kunnen vanaf de 4^{de} –6de week opgestart worden indien de analytische kracht goed is
- * oefeningen op plankjes, tol, trampoline...
- * evenwichtoefeningen, uitvalsbewegingen in voorachterwaartse en zijwaartse richting

Functionele oefeningen:

* na 3 maand:

- looptraining progressief opbouwen
- sprongoefeningen
- bewegingen in verschillende richtingen (voorachterwaarts en zijwaarts)

* na 4-5 maand:

- sportspecifieke oefeningen

Sporthervatting:

*na 6 weken: - aquatraining
- zwemmen (crawl)
- fietsen

* na 3 maanden: looptraining

* na 4-6 maanden: non-contact sporten

* na 6 maanden: contact sporten

De aangeduide tijdstippen zijn slechts indicatief en dienen aangepast te worden aan de mogelijkheden en eventuele revalidatieproblemen van de patiënt.

DR. HANS VAN DEN WYNGAERT

Orthopedisch chirurg - gespecialiseerd in de behandeling van knieletsels

AZ Alma
Ringlaan 15
9900 Eeklo (BE)

RIZIV 1-08298-51-480
TEL +32 (0)9 310 04 36
MAIL secr.ortho@azalma.be